

Pour déterminer comment évaluer avec précision l'état nutritionnel d'une personne, les cliniciens doivent comprendre la différence entre les affections cliniques qui modifient le phénomène de fonte adipeuse et musculaire. Les affections (la malnutrition, la cachexie, la sarcopénie et l'affaiblissement) se ressemblent sur le plan phénotypique, mais leurs causes et leurs traitements diffèrent. La fonte adipeuse et musculaire causée par la malnutrition répond à l'alimentation, mais celle associée à la cachexie, à la sarcopénie et à l'affaiblissement ne répond pas nécessairement à un traitement nutritionnel adéquat, à moins qu'il soit appuyé par d'autres modalités telles que l'exercice (sarcopénie) et un traitement spécifique de la maladie (p. ex., l'infliximab dans le cas de la maladie de Crohn). Dans ce court article d'opinion, le Dr Khursheed Jeejeebhoy explique la différence entre les phénotypes pour aider les cliniciens dont l'horaire est chargé à comprendre comment reconnaître les diverses causes de la fonte adipeuse et musculaire et, ainsi, les guider dans l'établissement de plans nutritionnels et thérapeutiques appropriés. Pour consulter l'article, visitez le : DOI:10.1097/MCO.0b013e328352694f.

Décembre 2016